



Informasjon om digital dermatitt



DIGITAL DERMATITT



DIGITAL DERMATITT

Digital dermatitt er en smittsom klauvsjukdom som gir hudbetennelse i, foran eller bak i klauvspalten opp mot biklauvene. Den kan gi smerte og halthet, og i alvorlige tilfeller må kua utrangeres. Foreløpig er de tilfellene vi ser i Norge lite aggressive og ikke alltid smertefulle. Erfaringer fra andre land viser imidlertid at vi kan forvente en rask forverring med stadig flere og mer alvorlige tilfeller. Innkjøp av dyr er den vanligste måten å få smitte inn i besetningen på, men smitte kan også overføres via annen direkte kontakt mellom dyr og via utstyr og sko med møkk på.

Ta kontakt med din veterinær eller TINE veterinær for mer informasjon om hvordan du kan begrense risikoen for digital dermatitt i din besetning.

Anbefalinger

1. Ikke salg av livdyr fra besetninger som har dyregrupper med digital dermatitt. Salg fra andre dyregrupper enn den med diagnosen kan vurderes av veterinær i hvert enkelt tilfelle (jo mer atskilt dyra oppstalles og jo mer separat og rent utstyr som brukes jo lavere smitterisiko). Dette gjelder også dyr som skal på fellesbeite. Kontroll av klauvene i klauvboks i den aktuelle dyregruppa er nødvendig for å dokumentere klauvhelsen.

2. Følg behandlings- og kontrollplan som veterinær har utarbeidet for besetningen.

3. Når digital dermatitt ikke er påvist etter to kontroller av klauvene på alle dyra i aktuell dyregruppe over en periode på minst 6 mnd, kan veterinær vurdere gjenopptak av salg. Kun dyr med rene klauver og uten noen form for hudbetennelse (også interdigital dermatitt), kan vurderes for salg.

4. Kontroller klauvspalten på alle dyr i aktuell dyregruppe regelmessig med innrapportering

til Kukontrollen. Klauvspalten må reingjøres og huden foran, i og bak i klauvspalten og opp mot biklauvene, bør inspiseres av sertifisert klauvskjærer (hvis tilgjengelig), annen klauvskjærer eller veterinær.

5. Klauvene på dyr som skal selges spyles rene og dyra bør helst gå gjennom desinfiserende fotbad før de går inn på dyretransporten. Etter transport og før inngang i mottaksbesetning bør dyra fotbades. Det settes inn fotbad noen uker i aktuell dyregruppe, etter ankomst i mottaksbesetningen (mest aktuelt for mjølkeku).

6. Utfør rutinemessig klauvskjæring minst to ganger i året av alle kyr og kviger over 18 mnd, for å kunne oppdage digital dermatitt så tidlig som mulig og sette inn tiltak. I besetninger med nylig påvist smitte, anbefales kontroll minst fire ganger i året og oppfølging av enkelt dyr enda hyppigere.

7. Til kjøper: Ikke kjøp dyr uten dokumentasjon på egen klauvhelse og klauvhelsen i besetningen dyret kommer fra.



Alvorlig tilfelle av digital dermatitt på ei svensk ku.



Mild hudbetennelse (interdigital dermatitt) kan også bære smitte som forårsaker digital dermatitt.



Det er viktig å vaske klauvene skikkelig, for å kunne inspisere klauvspalten.

Mer informasjon om digital dermatitt, kontroll og tiltak finner du her:
<http://storfehelse.no/klauv/klauvtilstander/digital-dermatitt>

I samarbeid med: **geno** **Nortura**  **KLF**  **TYR**

Kontaktpersoner i TINE Rådgiving og Helsetjenesten for storfe finner du på: medlem.tine.no og storfehelse.no